

长春园林植保



长春市林业和园林局 主管
长春市园林植物保护站 主办

园林植保热线：88934057

2019-04-16 星期二
第02期（总第202期）



本期封面昆虫：斑雅尺蛾雌成虫 *Apocolotois arnoldiaria*(Oberhur)

植保动态

粘虫胶防治害虫工作已经顺利开展

治早治小，精准除治

从无到有，迎难而上

我们在行动

坚持物理防治，事半功倍

测报与防治

重点关注：

斑雅尺蛾

榆紫叶甲

天幕毛虫

春尺蠖

苹桧锈病

植保动态

粘虫胶防治害虫工作已经顺利开展

随着温度回升，万物开始复苏。春尺蠖、榆紫叶甲、松毛虫等害虫也开始离开越冬场所，从解冻的土壤中爬到树上，聚集在即将绽放的嫩芽旁，等待着一顿“盛宴”。只可惜在这一切发生之前，我们早已经布下天罗地网，园林植保站三月中下旬组织全市 17 家绿化单位，对 2 万余株寄主植物进行了粘虫胶防治害虫工作。技术人员到各施工现场进行技术指导。该方法绿色无公害，不使用任何化学药品，操作简单、成本低、效果显著。（园林植保站 周拓）



园林植保站技术人员现场指导粘虫胶防治害虫工作

治早治小，精准除治

早春的天气还带着一丝寒意，园林植保站技术人员早已奔走于各个公园和街路，观察着那些早期活动且不易被察觉的病虫。经技术人员监测斑雅尺蛾于 3 月 26 日已开始孵化，在我市危害绣线菊、榆叶梅、女贞等多种植物，常常将萌发的嫩芽吃的所剩无几，极大的影响植物健康和景

观效果。经过技术人员和绿化养护单位的紧密配合，已对多处虫害发生地点进行了科学有效的精准防治，做到哪里有虫治哪里，坚决避免盲目大面积喷药造成的资源浪费和生态环境的破坏。（园林植保站 周拓）

| 从无到有，迎难而上



园林土壤理化性质测定

近几年观察发现，很多园林植物病害都是由于土壤问题导致的，而对土壤做理化性质分析需要到其他部门进行，时间周期较长。园林植保站领导很重视园林土壤问题，购置检测仪器，鼓励技术人员从无到有尝试检测土壤的各种理化性质。园林植保站技术人员通过查文献、到相关单位学习，掌握了较为完整的土壤检测方法。目前已经可以对土壤的基本指标进行检测。

我们在行动

| 坚持物理防治，事半功倍

刮除卵块，清除越冬虫体都是物理防治方法，也是园林植保站一直倡导的无公害防治方法。南关区园林管理处、九台区园林管理处、



九台区园林管理处清除卵块

宽城区园林管理处三家单位连续多年坚持春季刮除害虫越冬卵块，既减少化学农药的使用，保护了生态环境，又省时省力地保护了植物生长。

(园林植保站 周拓)

测报与防治

本期重点关注

斑雅尺蛾：幼虫已经孵化，数量多时在寄主上会形成薄网幕，取食植物嫩芽、嫩叶。个别地点虫口密度大。我市寄主为绣线菊、小叶丁香、榆叶梅、女贞、紫叶李、李子、榆、三角枫等多种植物。



榆紫叶甲：成虫大量上树危害，啃食寄主嫩芽。我市寄主为榆。

天幕毛虫：幼虫已经孵化。我市寄主为京桃、榆叶梅、山杏等多种植物。

春尺蠖：成虫羽化，沿树干向上爬，准备交尾产卵。我市寄主为榆、杨、柳、槐、山杏、李等多种植物。防治方法：喷洒触杀或胃毒性杀虫剂或者早春在寄主主干上缠粘虫胶带。



天幕毛虫



榆紫叶甲

苹桧锈病：在桧柏、爬地柏上的冬孢子将在 4 月下旬成熟，萌发后会传播到周围转主寄主植物上，引起不同程度的锈病发生。**想要防治苹桧锈病的单位请密切关注园林植保站微信工作群的防治通知**。防治方法：向桧柏、爬地柏喷洒 29%石硫合剂（配药比例：1 瓶 1000 毫升的药兑 27 斤水）。

舞毒蛾：向阳背风处少量幼虫已经孵化。我市寄主为杨、柳、蒙古栎、李、榆、海棠、山楂、杏等多种植物。

榆绿毛萤叶甲：成虫上树补充营养。我市寄主为榆。

山楂粉蝶：幼虫陆续在 4 月下旬孵化，低龄幼虫群集危害叶芽、花蕾、叶片。我市寄主为京桃、榆叶梅、杏、山楂等多种植物。

草履蚧：若虫已上树。我市寄主为柳、榆、稠李、卫矛、接骨木等多种植物。防治方法：喷洒触杀或胃毒性杀虫剂或者早春在寄主主干上缠粘虫胶带。

落叶松毛虫：越冬幼虫上树时期。各单位注意监测。我市寄主为落叶松、红松、樟子松、云杉、冷杉。

以上病虫害如无特殊说明，防治方法均可喷洒触杀或胃毒性杀虫剂。

主 编：韩军玲
编 辑：许晓明 邓小芳 刘智会 张凯 石光
传 真：0431-88912660
地 址：长春市岳阳街 1300 号
邮 编：130022
植保 Q 群：49497209
E-mail: ccsylzbz@163.com



官方微信公众平台

抄 报：钱万成主任、刘忻市长、周贺副市长、市人大城环委、市政协人资环委、市建委、林业和园林局。

抄 送：各区区长、区绿化办、区建委、市、区园林部门。