



长春市林业和园林局 主管
长春市园林植物保护站 主办

园林植保热线：88934057

2022-05-11 星期三
第01期（总第217期）



本期封面：苹桧锈病冬孢子角

共克时艰，把失去的时间“抢”回来
美国白蛾越冬代成虫监测工作已经开始

重点关注：

天幕毛虫 斑雅尺蛾
春尺蠖 榆紫叶甲
苹桧锈病

共克时艰，把失去的时间“抢”回来

突如其来的新冠疫情使长春市各行各业骤然停摆，园林绿化的各项工作也受到很大影响。在全市疫情防控工作取得阶段性成效后，园林植保站按照市疫情防控工作部署，已妥善安排职工复工返岗。

在防疫第一的前提下，园林植保站领导迅速组织各部门立即投入到街路、公园的实际调查，克服疫情带来的困难，根据病虫害特点做好近期工作安排，把失去的时间“抢”回来。



美国白蛾越冬代成虫监测工作已经开始

根据长春市有害生物防控办公室工作部署，美国白蛾越冬代成虫监测工作已经开始。由于疫情原因，我单位将在近期组织无接触发放美国白蛾诱捕器，请各单位收到诱捕器后马上组织人员按要求悬挂，继续执行一日一报，监测结果发到[长春市园林信息综合管理平台](#)。

本期重点关注




天幕毛虫：幼虫结网幕群集取食植物叶片。我市寄主为京桃、山杏、榆叶梅、李、稠李等多种植物。现阶段可人工剪除网幕



斑雅尺蛾：老熟幼虫暴食期，数量多时可将寄主叶片全部食光。我市寄主为榆叶梅、榆、小叶丁香、锦鸡儿、绣线菊、女贞、杨、稠李等多种植物。



春尺蠖：低龄幼虫危害期，我市寄主为榆、杨、槐、山杏、稠李、李等多种植物。



榆紫叶甲：成虫已交尾产卵。我市寄主为榆。

苹桧锈病：桧柏上还有冬孢子，现阶段可以对针叶寄主和阔叶寄主同时进行药物防治。我市寄主为桧柏、砂地柏、山楂、海棠、梨、苹果等多种植物。防治方法：桧柏、砂地柏喷洒石硫合剂。阔叶寄主喷洒 40% 苯醚甲环唑悬浮剂。



舞毒蛾



榆绿毛萤叶甲

舞毒蛾：幼虫已经孵化，低龄幼虫啃食寄主叶片表皮。我市寄主为杨、柳、榆、榆叶梅、山杏、京桃等多种植物。

榆绿毛萤叶甲：越冬成虫取食寄主叶片并交尾产卵。我市寄主为榆。

榆跳象：幼虫期，在叶片上下表皮间潜食。我市寄主为榆。



杨潜叶跳象



柳十八斑叶甲

杨潜叶跳象：幼虫潜食叶肉，在潜道末端做圆形叶苞，落于地面，时有跳动，幼虫在叶苞内化蛹。我市寄主为杨。防治方法：可将叶苞收走集中烧毁。

柳十八斑叶甲：越冬成虫上树取食寄主叶片补充营养并交尾产卵。我市寄主为柳。

核桃扁叶甲：越冬成虫取食寄主芽、嫩叶并交尾产卵。我市寄主为核桃楸。

杨树腐烂病：正是发病期，个别地段受害较重，5月份是我市的发病高峰期，我市寄主为杨、柳。防治方法：加强养护管理，提高树势。对于病斑较小

的部位可人工在发病病斑部位用刀划间隔 1 厘米的线，深达木质部，划线范围比病斑范围大 1 厘米，然后在划线部位涂抹甲基托布津 50 倍液。

光肩星天牛：幼虫在皮下蛀道为害，排出木屑。我市寄主为糖槭、杨、柳、榆、桦等。防治方法：插毒签防治。

山楂粉蝶：幼虫暴食阶段。我市寄主主要有京桃、山丁子、榆叶梅、山里红、山杏等。

柏毒蛾：低龄幼虫危害期。我市寄主为桧柏。



柏毒蛾



山楂粉蝶

桑褶翅尺蛾：1-2 龄幼虫危害期。我市寄主为女贞，杨、刺槐、榆、柳等多种植物。

落叶松球蚜：若虫分泌蜡丝，个别地点危害较重。我市寄主为落叶松。防治方法：喷洒 3.2% 甲维·啉虫脒微乳剂 3000-4000 倍液或 1.2% 苦·烟乳油 1000 倍液。

以上虫害如无特殊说明，防治方法均可喷洒触杀或胃毒性杀虫剂。

主 编：韩军玲 副主编：董 涛 张文远
编 辑：邓小芳 刘智会 赵晨宇 韩云鹤
传 真：0431-88912660
地 址：长春市岳阳街 1300 号
邮 编：130022
植保 Q 群：49497209
E-mail: ccsylzbz@163.com



官方微信公众平台