

长春园林植保



长春市林业和园林局 主管
长春市园林植物保护站 主办

园林植保热线：88934057

2024-07-04 星期四
第 02 期（总第 226 期）



本期封面：斑雅尺蛾 *Apocolotois arnoldiaria*(Oberhur)

测报与防治

重点关注：

美国白蛾 光肩星天牛 桃红颈天牛 榆跳象 柳十八斑叶甲 榆绿毛萤叶甲

粘虫 淡剑贪夜蛾 草地螟 杨锤角叶蜂

测报与防治

本期重点关注

以下虫害如无特殊说明，防治方法均可喷洒触杀或胃毒性杀虫剂。

美国白蛾：目前是第一代成虫监测期及第一代幼虫调查期。请各单位在近期多关注美国白蛾寄主植物，发现幼虫及时处理。我市寄主为水曲柳、糖槭、桑、榆、李、杏、杨、柳等多种植物。

光肩星天牛：成虫已经羽化，仍有幼虫和蛹在蛀道内。我市寄主为糖槭、柳树、垂榆、红枫、五角枫等多种植物。防治方法：幼虫使用插毒签的方法进行防治，成虫喷洒 3% 高效氯氰菊酯微囊悬浮剂 600 倍。

桃红颈天牛：成虫期，羽化期不整齐。我市寄主为京桃、稠李、山杏等多种植物。

榆跳象：成虫为害期，取食寄主叶片，个别地点虫口密度大。我市寄主为榆。



柳十八斑叶甲：卵、幼虫、蛹、成虫各个虫态混合发生，成虫、幼虫均可取食，造成叶片残缺。我市寄主为柳。

榆绿毛萤叶甲：第二代成虫为害期。我市寄主为榆。

粘虫：幼虫危害期。我市寄主为禾本科植物及草坪草。

淡剑贪夜蛾：幼虫危害期。我市寄主为禾本科植物及草坪草。

草地螟：幼虫危害期。我市寄主为禾本科植物及草坪草。

杨锤角叶蜂：幼虫期，龄期不整齐，个别地点虫口密度大。我市寄主为杨、柳。

草坪白粉病：正是发病期。我市寄主为草坪草。防治方法：喷洒 40%苯醚



甲环唑悬浮剂、三唑酮，每 5-7 天喷洒一遍，连续喷两遍。喷药后 6 小时内不能淋雨。



草坪锈病：正是发病期。我市寄主为草坪草。喷洒 40%苯醚甲环唑悬浮剂、三唑酮，每 5-7 天喷洒一遍，连续喷两遍。喷药后 6 小时内不能淋雨。

蚜虫：高温天气蚜虫危害较重，结合修剪，进行药物防治。京桃、山杏、等多种植物都有发生。

丝绵木金星尺蛾：目前正是幼虫期，我市寄主为女贞、槐等。

落叶松球蚜：干母刺激云杉冬芽，导致针叶和主轴变形，形成虫瘿，内居瘿蚜。我市寄主为落叶松、云杉。防治方法：人工摘除虫瘿集中烧毁或在瘿蚜迁飞期内喷洒触杀类杀虫剂。



白星滑花金龟



大地老虎及危害状



糖槭叶枯病



落叶松球蚜

白星滑花金龟：成虫交尾。我市寄主为榆、柳、梨、花卉等多种植物。

人纹污灯蛾：老熟幼虫期。我市寄主为杨、槐、月季、石竹等多种植物。

大地老虎：幼虫在寄主根部为害。我市寄主为马蔺等植物。

糖槭叶斑病：正是发病期。我市寄主为糖槭。防治方法：喷洒杀菌剂如甲托，每 5-7 天喷洒一遍，连续喷两遍。喷药后 6 小时内不能淋雨。喷洒药物是为了不让病情进一步扩散，并不能使病斑消退。可结合修剪同时进行。

主 编：高红云 副主编：董 涛 张文远 顾 问：韩军玲
编 辑：邓小芳 刘智会
传 真：0431- 88912660
地 址：长春市岳阳街 1300 号
邮 编：130022
植保 Q 群：49497209
E-mail: ccslzbz@163.com



官方微信公众平台